

	Prenoxad® 0,91 mg/ml Seringue préremplie 2ml +2 aiguilles	Nyxoid® 1,8 mg Solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose
Molécule	Chlorhydrate de naloxone anhydre	Chlorhydrate dihydraté de naloxone
Mode d'action	Antagoniste pur et spécifique des récepteurs aux opioïdes	Antagoniste pur et spécifique des récepteurs aux opioïdes
Indication	« Traitement d'urgence des surdosages aux opioïdes, caractérisés ou suspectés, se manifestant par une dépression respiratoire et/ou une dépression du système nerveux central, dans l'attente d'une prise en charge par une structure médicalisée »	« Traitement d'urgence des surdosages aux opioïdes, connu ou suspecté, se manifestant par une dépression respiratoire et/ou du système nerveux central, à la fois dans un environnement non médical et un environnement de soins. »
Voie d'administration	Intramusculaire	Voie nasale
Posologie	<u>Adulte</u> : 0,4 ml. A renouveler si besoin 2 à 3 minutes après la première dose	<u>Adulte et adolescents âgés de 14 ans et plus</u> : 1,8 mg, administrée dans une narine (un pulvérisateur nasal). A renouveler si besoin 2 à 3 minutes après la première dose.
Prescription	Non soumis à une prescription médicale (si délivrance d'une seule boîte), remboursé à 65 %	Soumis à prescription médicale obligatoire Remboursé à 65 %
Délai et durée d'action	Délai d'action : quelques secondes à quelques minutes Durée d'action : limitée, 20 min à 2h environ	Délai d'action : quelques secondes à quelques minutes Durée d'action : limitée, 20 min à 2h environ
Circuit de distribution	Officine via les grossistes-répartiteurs (depuis le 15/10/20), établissement de santé et structure médico-sociale	Commande auprès de CSP en charge de la distribution pour Mundipharma SAS : commande signée, avec tampon, code RPPS, adresse et nom du pharmacien sur pharmacie@csp-epl.com ou par fax 09 71 00 70 35.